





乳がんに関する調査

2007年3月16日


属性 対象：女性100%



(n = 1030)




未既婚




属性 対象：女性100%

子供の有無




(n = 1030)

職業




[Q1]あなたが取る行動は次のうちどれですか？




(n = 1030)


[Q2]乳がんの疑いがあるため精密検査が必要となった場合、
あなたは、何種類かの検査方法があるのをご存知ですか？



[Q3]乳がんの精密検査の検査方法により、あなたは、結果の正しさ(がんかがんではないか)に差があるのをご存知ですか？



[Q4]乳がん検診で乳がんの疑いがあるとわかった場合、あなたは、再度、病院で(場合によっては数回)精密検査をする必要があるのをご存知ですか？



[Q5]乳がんの精密検査で、以下の特徴をもつ3種類の検査があった場合、あなたはどの検査を選択しますか？最もあてはまるものをひとつお選びください。

【A】傷口は小さく麻酔・縫合の必要は無い1回では診断のつかない可能性のある検査

9.4%


【B】傷口のサイズはAとCの中間で、局所麻酔はするが縫合の必要は無い正確さはAとCの中間であり、1回では診断がつかない可能性のある検査

6.1%

【C】傷口のサイズはBと同様か少し大きく、局所麻酔はするが縫合の必要は無い この3種類の検査中、一番確実に診断のつく検査


84.5%

(n = 1030)




[Q6]あなたに乳がんの疑いがあるため、精密検査が必要となった場合、 がんかどうかの確定診断が下されるまでに何回までなら通院できますか？


※前問のような様々な種類の検査があることを前提にお答えください。



[Q7]あなたに乳がんの疑いがあるため精密検査が必要となった場合、
確定診断が下されるまでにどの程度の期間ならば、再検査のために待た
されても構いませんか？



[Q8]あなたにとって重要と感じる順に、以下の項目を1位から4位までお選びください。※1位が「一番重要」となります。



「確実に！早く！診断結果を知りたい。」